

Instrucciones para la Prueba de Alergia

Por favor espere unos 60-90 minutos, use una camisa holgada de manga corta o sin manga. La prueba generalmente se realiza en ambos brazos. Si tiene asma, **debe traer consigo su inhalador de rescate de albuterol recetado**. No deje de tomar sus medicamentos habituales para el asma. Debe estar presente un padre durante las pruebas para menores. **Por favor evite la actividad extenuante 2 horas antes y después de las pruebas de alergia.**

Medicamentos a Evitar Antes de las Pruebas de Alergia

El medicamento que figura a continuación interferirá con las pruebas cutáneas de alergia y debe suspenderse según lo especificado. Si tiene una afección médica que puede empeorar sin uno de los medicamentos o tiene preguntas, comuníquese con nuestro consultorio antes de suspender el medicamento.

Alergia Retener por 7 días	Acidez GERD Retener por 2 días	Ansiolíticos Retener por 5 días	Suplementos Herbales Retener por 5 días	Misceláneos	Si toma alguno de estos, llame a nuestro consultorio
difenhidramina (Benadryl, Allernix, Nytol)	cimetidina (Tagament)	hidroxicina (Atarax, Marax, Vistaril)	Regaliz	Compazine Retener por 3 días	Amitriptilina (Elavil) Clomipramina (Anafranil)
clorfeniramina (Clortrimeton, Deconamine, Kronofed, Novafed, Rynatan, Tussinex)	ranitidina (Zantac) prometazina (Phenergan)	Alprazolam (Xanax)	Té Verde	Cisaprida Retener por 24 horas	Doxepina (Sinequan) Imipramina (Tofranil)
clemastina (Tavist, Antihist)	Nizatidina (Axid)	Clonazepam (Klonopin)	Serenoa	Reglan Retener por 24 horas	Trimipramina (Surmontil)
pseudoefedrina (Actifed, Aprodine, Wal-Act)	Famotidina (Pepicd)		Hierba de San Juan	Singulair Retener por 24 horas	Amoxapina (Asendin)
bromfeniramina (Actifed, Atrohist, Dimetapp, Drixoral)	Omeprazol (Prilosec)	Gotas Oculares Retener por 5 días	Matricaria	Zyflo Retener el día de la prueba	Desipramina (Nurpramin)
loratadina (Claritin, Claritin D, Alavert)	Lansoprazol (Prevacid)	bepotastina (Bepreve)	Vitamina C	Accolate Retener el día de la prueba	Nortriptilina (Pamlor, Aventyl)
fexofenadina (Allegra) desloratadina (Clarinex)	rabeprazol (Aciphex)	ketotifeno (Zaditor, Alaway)	Polen de Abeja	"Medicamentos PM" Retener por 5 días	Protriptilina (Vivactil)
cetirizina (Zyrtec)	Aerosol Nasal Retener por 5 días	olopatadina (Pataday, Patanase)	Cardo Mariano	Tylenol PM Advil PM Excedrina PM	Maprotilina (Ludimoil)
diclorhidrato de levocetirizina (Xyzal)	azelastina (Astelin, Astepro, Dymista, Optivar)	feniramina (Visine A, Naphcon A) – OK en detener por 2 días	Astrágalo	Simplemente dormir Nyquil	Trazodona (Desyrel) Nefazodona (Serzone)



Mendy Maccabee, MD

Board Certified ENT and Allergy Care • FACS, FAAAA